



Con của quý vị cần xét nghiệm máu xem có chì trong máu hay không nếu chúng ...

- sống trong hoặc thường xuyên ghé thăm một ngôi nhà xây trước năm 1950?
- sống trong hoặc thường xuyên ghé thăm một ngôi nhà xây trước năm 1978 đã hay đang được sửa chữa hoặc tu bổ?
- sống trong nhà dưỡng nhi tạm thời?
- có bạn hay anh chị em có độ chì cao trong máu?
- có phụ huynh hoặc người chăm sóc với sở thích hay việc làm có xử dụng chất chì?
- đến từ một quốc gia ngoài Hoa Kỳ?
- được bao trả bởi Apple Health/Medicaid (xem dưới đây)?

Quý vị đã trả lời "Có" hay "Có thể" cho một trong những câu hỏi này?

Tách rời thẻ dưới đây và đưa thẻ cho bác sĩ trong lần khám sức khỏe kế tiếp cho con em. **Nhận xét nghiệm MIỄN PHÍ do Medicaid cung cấp** nếu con em có **bảo hiểm Apple Health** mặc dầu con em của quý vị không có yếu tố hiểm nguy nào khác.

My child needs a blood lead screening test.



Public Health
Seattle & King County



Tại sao con tôi cần được xét nghiệm chì?

Chất chì dù chỉ lượng nhỏ thôi có thể gây hại cho sự phát triển não bộ của con em. Khi chất chì vào cơ thể, nó làm con em gặp khó khăn trong việc học, khó chú ý và không học giỏi được.

Ngộ độc chì gồm có những triệu chứng nào?

Hầu hết các trẻ em có chất chì trong cơ thể nhìn không có vẻ bệnh hoạn hoặc ra vẻ đang bị bệnh. Xét nghiệm máu là cách duy nhất để biết con em có ngộ độc chì hay không.

Nguyên nhân gây ngộ độc chì là gì?

Bụi chì và các mẩu chì vụn từ nước sơn nhà xây xưa cũ kỹ là một trong những nguồn tiếp xúc lớn nhất với chì. Bụi chì bám vào đồ chơi và tay của trẻ em. Khi chúng cho tay hay đồ chơi vào mồm là lúc chúng nuốt phải chì. Những điều khác có thể gây ra ngộ độc chì là:



Đất và nước lã



Đồ nhựa, đồ chơi cũ, đồ trang sức, chìa khoá



Đồ gốm hay bát đĩa thủ công



Mỹ phẩm hay gia vị nhập cảng

Để biết thêm thông tin về chất chì và để biết nguy cơ tiếp xúc chất chì trong khu vực quý vị đang sống, xin truy cập vào www.doh.wa.gov/lead

Provider: The State DOH lead risk factor questionnaire identified this child as having one or more risk factors for lead exposure.

Federal law mandates that all children enrolled in Medicaid are required to get blood lead screening tests at ages 12 and 24 months. Any child between 24 and 72 months with no record of a previous blood lead screening test must receive one.

For more information visit: www.doh.wa.gov/lead

